

# Reconnaître les signes d'un AVC.



**V**isage paralysé



**I**nertie d'un membre



**T**rouble de la parole



**E**n urgence appelle le 15



Les signes surviennent brutalement,  
un seul signe suffit  
et chaque minute est essentielle.

Pour plus d'informations sur l'AVC,  
parlez-en avec votre professionnel de santé  
et rendez-vous sur notre site



**avcvite15.com**



En collaboration avec  
**Bayer HealthCare**

84838527-0915 - L.F.R.MKTGM.09.2015.0910 - Bayer HealthCare SAS - SAS au capital de 47 857 291,14 € - RCS Lille Métropole 706 680 149 - Une campagne réalisée par l'agence FMAD.

## Le vrai danger ne prévient pas toujours.

En France, un AVC survient toutes les 4 minutes.  
Maintenant, vous êtes prévenu.



**avcvite15.com**

# Qu'est-ce qu'un AVC\* ?

Un AVC, encore appelé attaque cérébrale, est secondaire à une lésion d'un vaisseau du cerveau.

Il existe **2 types d'AVC**.

► **L'infarctus cérébral** ou **accident ischémique cérébral**.

Il s'agit le plus souvent d'une occlusion d'une artère qui empêche le passage du sang.

► **L'hémorragie cérébrale** ou **accident hémorragique**.

Moins fréquent (15 à 20 % des cas), il s'agit de la rupture d'une artère, le sang qui en est issu endommageant le cerveau à son niveau.

**Plus de 100 000 nouvelles personnes sont victimes d'AVC chaque année en France.**

## Les AVC représentent

**1<sup>ère</sup>**

cause de **handicap physique** chez l'adulte

**2<sup>ème</sup>**

cause de **déclin intellectuel** (après la maladie d'Alzheimer)

**3<sup>ème</sup>**

cause de **mortalité** après les maladies cardiovasculaires et les cancers.

## Après l'AVC ?

Les répercussions d'un AVC dépendent de la rapidité de la prise en charge, de l'étendue de la zone touchée et de la zone cérébrale atteinte.

**41 %**

des patients n'ont **plus de séquelles**

**34 %**

**ne peuvent marcher** sans assistance

**25 %**

présentent **un handicap léger** ou modéré

### Les séquelles les plus fréquentes après un AVC

- les troubles de l'équilibre et les troubles de la mémoire,
- les paralysies d'un ou plusieurs membres,
- les troubles du langage.



**Après un 1<sup>er</sup> AVC, on a 3x plus de risque de faire un second AVC dans les 5 ans.**

Professionnels de santé, traitements, règles d'hygiène de vie, associations de patients... sont indispensables pour **aider les personnes à récupérer après un AVC et à éviter la survenue d'un deuxième événement.**